



Một nghiên cứu châu Âu báo cáo rằng nam giới được xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) thường quy để kiểm tra các dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt giảm khả năng tử vong do bệnh này.

Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học đã xem xét hồ sơ bệnh án của hơn 160.000 nam giới từ 8 quốc gia châu Âu.

Những người tham gia được tuối từ 55-69 tuổi thì đi tìm bệnh để tham gia nghiên cứu. Một số được chia ngẫu nhiên để thực hiện các xét nghiệm sàng lọc PSA.

Sau thời gian trung bình là 11 năm, nam giới được sàng lọc giảm 21% nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt.

Các kết quả nghiên cứu được đăng trên số ra ngày 15/3 của tạp chí *New England Journal of Medicine*.

Tiến sĩ Anthony Miller, thuộc Trường Y tế công cộng Đại học Toronto, khuyến cáo rằng xét nghiệm PSA chỉ nên thực hiện ở nam giới có các triệu chứng rõ về ung thư tuyến tiền liệt hoặc số đáng để theo dõi điếu trước cho nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt. Ông không khuyến nghị sàng lọc thường quy cho nam giới khỏe mạnh.

**Nguồn:** [Trang web Thông tin Y học Việt Nam – B.Y.T](#)

<http://www.cimsi.org.vn/>